

*Në rast marrje rreziku, presantoi  
letrat personelit te shendetrise*

## URGENCE MÉDICALE

À L'ATTENTION DU PERSONNEL MÉDICAL D'URGENCE :



*Dans les dernières 48 heures, j'ai eu  
un risque de transmission du VIH  
avec une personne dont je ne connais  
pas le statut sérologique.*

*Pour prévenir ce risque de transmission  
du VIH, je souhaite bénéficier  
d'un traitement antirétroviral.*

*Merci de bien vouloir me prendre  
en charge.*



PËR TË DITUR KU TË SHKOSH, PËR CONSULTË :

 **Sida Info Service.org**  
**0 800 840 800**  
Telefonatë sekrete, anonime dhe falas



Réalisé par CABIRIA, grâce au soutien financier  
de l'ANSM (Agence Nationale de la Sécurité  
des Médicaments), dans le cadre d'un appel  
à projets compétitifs.

**Sapo je ekspozuar  
me VIH-n...**



**... MOS PANIKO !  
Egziston një zgjidhje.**

## ► ÇFARË ËSHTË ?



48h

Është një kurë që merret mbas një rrezik transmetimi të VIH-s për të shmangur që të të ngjitet.

**Ke 48 orë për të filluar të pish KPE-n, por sa me shpejt aq më mirë.**



28

Pastaj, KPE-ja zgjat **28 ditë** me një ndjekje në spital.

## ► SI TA MARRËSH ?



H

**24o/24, 7d/7** në një shërbim urgjencash.

Mund të shkosh në një CeGIDD (qëndër depistazhi) sipas orareve të hapjes.

## DISA KËSHILLA PËR TI BËRË GIËRAT MIRË ;)

Që KPE të bëjë efekt, duhet ta pish **çdo ditë për 28 ditë rresht**, dhe pse rezultati i parë i analizës të gjakut është negativ.



**Vur një zile të përditëshme tek telefoni jot !**



Është e rëndësishme **të shkosh në të gjitha takimet e kontroleve, të dhëna nga spitali**, për të bërë testet dhe që doktorri të verifikojë që mëlçija jote dhe veshkat e tua e durojnë mirë kurën. Ai do ta adaptojë nëse është e nevojshme.



Nëse ndjen lodhje, marrje mendsh ose gjë tjetër, **mos e ndalo kurën**. Egzistojnë zgjidhje për të shmangur simptomat e padëshirueshëm. Konsultohu me shërbimin që të ka dhënë recetën e kurës, ata mund të të ndimojnë.



**Nëse një shok/shoqe të ka dhënë ilaçe** mbas një marrje reziku, është gjithsesi e rëndësishme të shkosh në spital për të bërë një ndjekje mjeksore.

Nëse është e mundur, sill ilaçet që ke pirë, kutinë ose një fotografi të kokrrave.

Ilaçet e dhëna për KPE-në ndryshojnë nëse je shtatzanë ose nëse pi një kurë tjetër.

**Të mos merrni kurrë një kurë pa një mendim mjeksor.**

Nëse nuk ke kontrceptiv, mos harro të marrësh kokrrën e të nesërmes (Lévonorgestrel) për **të shmangur shtatzaninë**.