Në rast marrje rreziku, presantoi letrat personelit te shendetrise

URGENCE MÉDICALE

À L'ATTENTION DU PERSONNEL MÉDICAL D'URGENCE :

Dans les dernières 48 heures, ***j'ai eu un risque de transmission du VIH*** *avec une personne dont je ne connais pas le statut sérologique.*

Pour prévenir ce risque de transmission du VIH, ***je souhaite bénéficier d'un traitement antirétroviral.***

Merci de bien vouloir me prendre en charge.

PËR TË DITUR KU TË SHKOSH, PËR CONSULTË :

Sida Info Service.org
0 800 840 800
Telefonatë sekrete, anonime dhe falas

Réalisé par CABIRIA, grâce au soutien financier de l'ANSM (Agence Nationale de la Sécurité des Médicaments), dans le cadre d'un appel à projets compétitifs.

Sapo je ekspozuar me VIH-n...

... MOS PANIKO !
Egziston një zgjidhje.

KPE

KURË POST-EKSPOZIMI

ÇFARË ËSHTË ?

48h

Është një kurë që merret mbas një rrezik transmetimi të VIH-s për të shmangur që të të ngjitet.

Ke 48 orë për të filluar të pish KPE-n, por sa me shpejt aq më mirë.

28

Pastaj, KPE-ja zgjat **28 ditë** me një ndjekje në spital.

SI TA MARRËSH ?

24o/24, 7d/7 në një shërbim urgjencash.

Mund të shkosh në një CeGIDD (qëndër depistazhi) sipas orareve të hapjes.

DISA KËSHILLA PËR TI BËRË GIËRAT MIRË ;)

Që KPE të bëjë efekt, duhet ta pish **çdo ditë për 28 ditë rresht,** dhe pse rezultati i parë i analizës të gjakut është negativ.

Vur një zile të përditëshme tek telefoni jot !

Është e rëndësishme **të shkosh në të gjitha takimet e kontrolleve, të dhëna nga spitali,** për të bërë testet dhe që doktorri të verifikojë që mëlçija jote dhe veshkat e tua e durojnë mirë kurën. Ai do ta adaptojë nëse është e nevojshme.

Nëse ndjen lodhje, marrje mendsh ose gjë tjetër, **mos e ndalo kurën.** Egzistojnë zgjidhje për të shmangur simtomat e padëshirueshëm. Konsultohu me shërbimin që të ka dhënë recetën e kurës, ata mund të të ndimojnë.

Nëse një shok/shoqe të ka dhënë ilaçe mbas një marrje reziku, është gjithsesi e rëndësishme të shkosh në spital për të bërë një ndjekje mjeksore.

Nëse është e mundur, sill ilaçet që ke pirë, kutinë ose një fotografi të kokrrave.

Ilaçet e dhëna për KPE-në ndryshojnë nëse je shtatzanë ose nëse pi një kurë tjetër.

Të mos merrni kurrë një kurë pa një mendim mjeksor.

Nëse nuk ke kontraceptiv, mos harro të marrësh kokrrën e të nesërmes (Lévonorgestrel) për **të shmangur shtatzaninë.**