Dacă te afli într-o situatie de risc, aratele broșură asta personalului de la spital

URGENCE MÉDICALE

À L'ATTENTION DU PERSONNEL MÉDICAL D'URGENCE :

Dans les dernières 48 heures, ***j'ai eu un risque de transmission du VIH*** *avec une personne dont je ne connais pas le statut sérologique.*

Pour prévenir ce risque de transmission du VIH, ***je souhaite bénéficier d'un traitement antirétroviral.***

Merci de bien vouloir me prendre en charge.

PENTRU A AFLA UNDE SĂ MERGI, VIZITĂ SITE-UL :

Sida Info Service.org
0 800 840 800
Apel confidențial, anonim și gratis

Réalisé par CABIRIA, grâce au soutien financier de l'ANSM (Agence Nationale de la Sécurité des Médicaments), dans le cadre d'un appel à projets compétitifs.

Tu tocmai ai avut un risc de expunere de HIV...

...NU INTRĂ ÎN PANICĂ ! Există o solutie.

PPE

PROFILAXIA POST-EXPUNERE

CE ESTE ?

48h

Este un tratament accesibil după un risc de a fi contaminat cu virusul HIV.

TPE dă cele mai bune rezultate, cu cât mai devreme începe după risc de expunere, dar cel mai târziu în termen de 48 de ore.

28

Apoi, tratamentul TPE durează **28 de zile** cu o supraveghere la spital.

CUM SE OBȚINE ?

H

24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână într-un serviciu de urgență.

Poți să mergi și la un centru CeGIDD (centru de depistare) în funcție de orele de deschidere.

CÂTEVA SFATURI PENTRU A FACE LUCRURILE BINE ;)

Pentru un tratament eficient, trebuie să iei TPE **în fiecare zi, timp de 28 de zile,** conform recomandării, chiar dacă rezultatul primului test de sânge este negativ.

Pune o alarma zilnică pe telefon !

Este important **să mergi la toate consultatiile de supraveghere stabilite de spital,** să faci teste și ca medicul să verifice cum funcționează ficatul și rinichii. El va adapta tratamentul dacă este necesar.

Tratamentul nu trebuie oprit chiar dacă efecte adverse apar ca oboseală, greață sau alte. Există soluții pentru a evita efectele secundare. Consultă serviciul care a prescris tratamentul, ei te pot ajuta.

Chiar **dacă un prieten / o prietenă ți-a dat medicamentele** după o expunere unei situații de risc, este important să mergi la spital pentru a face o supraveghere medicală.

Dacă este posibil, ădu pastilele care ți s-a administrat, cutia sau o fotografie a pastilelor.

Medicamentele prescrise pentru TPE scimba de la caz la caz, dacă ești însărcinată sau ai deja un alt tratament.

Niciodată să nu ei medicamente fără aviz medical

Dacă nu ai metodă contraceptivă, să nu uiți să iei pastila de urgentă (Lévonorgestrel) pentru a **evita o sarcină nedorită.**